

پروتکل کارآزمایی بالینی مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران

۱۴۰۵/۰۶/۲۵

بررسی تاثیر طب فشاری بر زمان برگشت حرکات دودی روده پس از سزارین در زنان بستری در بیمارستان ولی عصر شهر فسا در 1394

چکیده پروتکل

چکیده

هدف مطالعه: پیشگیری از ایلئوس، پس از جراحی های شکمی. طراحی انجام مطالعه: تصادفی شده ی یک سو کور. روش انجام مطالعه شامل: جمعیت مورد مطالعه: زنان سزارینی بستری در بخش زنان بیمارستان ولی عصر شهرستان فسا. معیارهای اصلی ورود به مطالعه: محدوده سنی حداکثر چهل و پنج سال، روش بیهوشی عمومی و متوسط مدت زمان جراحی یکسان. معیارهای اصلی خروج از مطالعه: استفاده حاد و مزمن از مخدرا پس از جراحی، وجود راه هوایی مصنوعی، وجود بیماری عروق محیطی، نیاز به تعبیه استومی، نیاز به ترانسفوزیون خون، بیماری تیروئید و دیابت، همچنین بیماری عصبی، عضلانی و کبدی. حجم نمونه: صد و بیست نفر. مداخله مورد مطالعه: اعمال طب فشاری در دو نقطه هوگو و زوسانلی. زمان مداخله: در مجموع بیست دقیقه که در هر کدام از نقاط ده دقیقه است. پیامد مطالعه: پس از اجرای مداخله انتظار می رود که حرکات دستگاه گوارشی در گروه مداخله، سریعتر از گروه کنترل برگردد.

اطلاعات عمومی

نام اختصاری

اطلاعات ثبت در مرکز

شماره ثبت کارآزمایی در مرکز: IRCT2016020815965N7

تاریخ تایید ثبت در مرکز: 1394/12/07, 26-02-2016

زمان بندی ثبت: retrospective

آخرین بروز رسانی:

تعداد بروز رسانی ها: 0

تاریخ تایید ثبت در مرکز

1394/12/07, 2016-02-26

اطلاعات تماس ثبت کننده

نام

مجید کاظمی

نام سازمان / نهاد

دانشکده پرستاری مامایی رفسنجان

کشور

جمهوری اسلامی ایران

تلفن

7663 3425 34 98+

آدرس ایمیل

dr.kazemi.n@rums.ac.ir

وضعیت بیمار گیری

بیمار گیری تمام شده

منبع مالی

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

تاریخ شروع بیمار گیری مورد انتظار

1394/08/01, 2015-10-23

تاریخ پایان بیمار گیری مورد انتظار

1394/11/01, 2016-01-21

تاریخ شروع بیمارگیری تحقق یافته

خالی

تاریخ پایان بیمارگیری تحقق یافته

خالی

تاریخ خاتمه کارآزمایی

خالی

عنوان علمی کارآزمایی

بررسی تاثیر طب فشاری بر زمان برگشت حرکات دودی روده پس از سزارین در زنان بستری در بیمارستان ولی عصر شهر فسا در 1394

عنوان عمومی کارآزمایی

اثر طب فشاری در بهبود حرکات دستگاه گوارشی.

هدف اصلی مطالعه

پیشگیری

شرایط عمده ورود و عدم ورود به مطالعه

معیارهای ورود: محدوده سنی حداکثر چهل و پنج سال، روش بیهوشی یکسان (بیهوشی عمومی) و متوسط مدت زمان جراحی یکسان. معیارهای خروج: شامل سن بالای چهل و پنج سال، بیحسی اسپینال، استفاده حاد و مزمن از مخدرا پس از جراحی، وجود راه هوایی مصنوعی، وجود بیماری عروق محیطی، نیاز به تعبیه استومی، نیاز به ترانسفوزیون خون، بیماری تیروئید و دیابت، همچنین بیماری عصبی، عضلانی، کبدی و عوارض ناشی از سزارین شامل خونریزی غیر طبیعی و هیستروکتومی می باشد.

سن

از سن 15 ساله تا سن 45 ساله

جنسیت

مونث

فاز مطالعه

مصادق ندارد

گروه‌های کور شده در مطالعه

اطلاعات موجود نیست

حجم نمونه کل

حجم نمونه پیش‌بینی شده: 120

تصادفی سازی (نظر محقق)

اختصاص تصادفی به گروه‌های مداخله و کنترل

توصیف نحوه تصادفی سازی

کور سازی (به نظر محقق)

یک سوبه کور

توصیف نحوه کور سازی

دارو نما

ندارد

اختصاص به گروه‌های مطالعه

موازی

سایر مشخصات طراحی مطالعه

کد ثبت در سایر مراکز ثبت بین‌المللی

خالی

تاییدیه کمیته‌های اخلاق

1

کمیته اخلاق

نام کمیته اخلاق

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

آدرس خیابان

میدان علی ابن ابیطالب، بلوار امام علی.

شهر

رفسنجان

کد پستی

تاریخ تایید

1394/10/20, 2016-01-10

کد کمیته اخلاق

IR.RUMS.REC.1394.189

بیماری‌های (موضوعات) مورد مطالعه

1

شرح

ایلتوس

کد ICD-10

K55-64

توصیف کد ICD-10

Other diseases of intestines

متغیر پیامد اولیه

1

شرح متغیر پیامد

اولین زمانی که سه صدای روده ایی در دقیقه شنیده می شود.

مقاطع زمانی اندازه‌گیری

هر دو ساعت یکبار پس از جراحی شنیده می شود.

نحوه اندازه‌گیری متغیر

توسط گوشی پزشکی شنیده می شود.

2

شرح متغیر پیامد

اولین زمان دفع مدفوع بیمار پس از جراحی.

مقاطع زمانی اندازه‌گیری

هر دو ساعت یکبار از بیماران پرسیده می شود.

نحوه اندازه‌گیری متغیر

گزارش آن توسط خود بیمار می باشد.

3

شرح متغیر پیامد

اولین زمان دفع گاز بیمار پس از جراحی.

مقاطع زمانی اندازه‌گیری

هر دو ساعت یکبار از بیمار پرسیده می شود.

نحوه اندازه‌گیری متغیر

گزارش آن توسط خود بیمار می باشد.

4

شرح متغیر پیامد

اولین زمان بلندشدن بیمار از تخت.

مقاطع زمانی اندازه‌گیری

هر دو ساعت یکبار از بیمار پرسیده می شود.

نحوه اندازه‌گیری متغیر

گزارش آن توسط خود بیمار می باشد.

متغیر پیامد ثانویه

1

شرح متغیر پیامد

میزان مخدری که حین بیهوشی استفاده شده است.

مقاطع زمانی اندازه‌گیری

پس از انتقال بیمار به بخش زنان.

نحوه اندازه‌گیری متغیر

گزارش عمل جراحی بیمار در پرونده.

2

شرح متغیر پیامد

میزان سرم دریافتی بیمار حین جراحی.

مقاطع زمانی اندازه‌گیری

پس از انتقال بیمار به بخش.

نحوه اندازه‌گیری متغیر

گزارش عمل جراحی بیمار ر پرونده.

گروه‌های مداخله

1

شرح مداخله

تعداد دفعات اعمال طب فشاری در گروه مداخله، دو مرتبه است که مرحله اول در حدود یک ساعت اول انتقال بیمار در بخش خواهد بود. مرحله دوم مداخله در حدود سه ساعت بعد از مداخله اول می باشد. مدت زمان مداخله برای هر یک از نقاط ده دقیقه با فشار ملایم انگشت شست در خلاف جهت عقربه های ساعت در محل نقاط انتخاب شده می باشد و برای همه افراد اعمال فشار در سمت راست بدن و اولین نقطه جهت شروع مداخله زوسانلی خواهد بود. برای پیدا کردن نقطه زوسانلی از نظر آناتومیکی سه چون پایین تر از لبه تحتانی استخوان کشکک آمده و سپس به اندازه پهنای یک انگشت به طرف خارج رفته و دقیقاً در راس قدامی تیپا و یا در بخش جلویی عضله تیپا قرار خواهد گرفت و همچنین جایگاه نقطه هوگو نیز از نظر آناتومیکی در قسمت

طبقه بندی موسسه تامین کننده اعتبار
خالی

فرد مسوول پاسخگویی عمومی کارآزمایی

اطلاعات تماس

فرد مسوول پاسخگویی علمی مطالعه

اطلاعات تماس

نام سازمان / نهاد

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

نام کامل فرد مسوول

فائزه آبادی

موقعیت شغلی

دانشجوی کارشناس ارشد پرستاری

سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها

آدرس خیابان

میدان علی ابن ابیطالب، خیابان امام علی.

شهر

رفسنجان

کد پستی

تلفن

3624 5341 71 98+

فکس

ایمیل

dr.kazemi.n@rums.ac.ir; Maj_kaz@yahoo.com;

faeze.abadi@yahoo.com

آدرس صفحه وب

فرد مسوول به‌روز رسانی اطلاعات

اطلاعات تماس

نام سازمان / نهاد

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

نام کامل فرد مسوول

فائزه آبادی

موقعیت شغلی

دانشجوی کارشناس ارشد پرستاری

سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها

آدرس خیابان

میدان علی ابن ابیطالب، خیابان امام علی.

شهر

رفسنجان

کد پستی

تلفن

3624 5341 71 98+

فکس

ایمیل

dr.kazemi.n@rums.ac.ir; Maj_kaz@yahoo.com;

faeze.abadi@yahoo.com

آدرس صفحه وب

برنامه انتشار

فایل داده شرکت کنندگان (IPD)

خالی

پروتکل مطالعه

خالی

نقشه آنالیز آماری

خالی

فرم رضایتنامه آگاهانه

پشت دست بین استخوان ماکارپ اول و دوم تقریباً در امتداد استخوان رادیال می باشد. تمام مراحل ذکر شده توسط فرد آموزش دیده زیر نظر متخصص طب سنتی انجام خواهد شد. سپس هر دو ساعت از بیماران در صورت داشتن دفع گاز، مدفوع و بلند شدن از تخت پرسیده می شود و صداهای روده ای بیماران، هر دو ساعت توسط گوشی پزشکی، شنیده خواهد شد و تمام موارد ذکر شده ثبت می شود

طبقه بندی

درمانی - غیره

2

شرح مداخله

گروه کنترل مراقبت معمول بخش را دریافت خواهند کرد. سپس هر دو ساعت از بیماران در صورت داشتن دفع گاز، مدفوع و بلند شدن از تخت پرسیده می شود و صداهای روده ای بیماران، هر دو ساعت توسط گوشی پزشکی، شنیده خواهد شد و تمام موارد ذکر شده ثبت می شود

طبقه بندی

مصادق ندارد

مراکز بیمار گیری

1

مرکز بیمار گیری

نام مرکز بیمار گیری

بیمارستان ولی عصر

نام کامل فرد مسوول

فائزه آبادی (دانشجوی کارشناس ارشد پرستاری)

آدرس خیابان

خیابان شیرازی روبروی دانشگاه علوم پزشکی فسا.

شهر

فسا

حمایت کنندگان / منابع مالی

1

حمایت کننده مالی

نام سازمان / نهاد

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

نام کامل فرد مسوول

دکتر مجید کاظمی

آدرس خیابان

میدان علی ابن ابیطالب، خیابان امام علی.

شهر

رفسنجان

ردیف بودجه

کد بودجه

آیا منبع مالی همان سازمان یا نهاد حمایت کننده مالی است؟

بلی

عنوان منبع مالی

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

درصد تامین مالی مطالعه توسط این منبع

100

بخش عمومی یا خصوصی

خالی

مبدأ اعتبار از داخل یا خارج کشور

خالی

طبقه بندی منابع اعتبار خارجی

خالی

کشور مبدأ

خالی
نظام دسته‌بندی داده (دیکشنری داده)
خالی

خالی
گزارش مطالعه بالینی
خالی
کدهای استفاده شده در آنالیز